



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ НАУКА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ФАУНИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БРЕСТСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Олешкевич Александра Сергеевна

магистрант, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Республика Беларусь, г. Гомель

Дневные и ночные бабочки, образующие отряд Чешуекрылых (Lepidoptera), – в числе наиболее ярких представителей класса Насекомых. Своё название отряд получил за микроскопические чешуйки, покрывающие крылья. Структура чешуек и содержащиеся в них пигменты обуславливают колоссальное разнообразие и сложность окраски и рисунка крыльев бабочек. Среди представителей чешуекрылых имеется большое количество как хозяйственно-ценных, так и опасных вредителей лесного и сельского хозяйства.

Практическое значение булавоусых чешуекрылых до последнего времени недооценивалось, поскольку число видов, непосредственно вредных сельскохозяйственным культурам, среди них невелико. Однако дневные бабочки очень чутко реагируют на изменение условий существования, и по наличию или отсутствию в данной местности определённых видов, по изменению в их распространении можно сказать, насколько здесь проявились результаты хозяйственной деятельности человека. Это индикаторное свойство булавоусых чешуекрылых переоценить трудно, поскольку именно оно придаёт особую важность их изучению на территории, природные ресурсы которой интенсивно используются.

Целью работы является изучение видового разнообразия булавоусых чешуекрылых на территории Брестского Полесья. В ходе проведения исследований был собран 21 вид булавоусых чешуекрылых в количестве 67 экземпляров, входящих в состав 18 родов и 5 семейств.

Антропогенный участок имеет фауну булавоусых чешуекрылых, включающую 5 видов. Преобладает следующий вид *Vanessa atalanta* (62,5%). Основную массу булавоусых чешуекрылых, обитающих на исследуемом участке, составляют представители из семейства Nymphalidae как в качественном, так и в количественном отношении.